

CANINO SUPERIOR INCLUIDO CON RIZALISIS DEL CENTRAL Y LATERAL SUPERIOR DERECHOS, INFORME DE UN CASO

Alfredo Valverde S. *

Key Word Index: Rhizalasis

RESUMEN

Se informa acerca de un canino superior derecho retenido que produjo rizalasis del central y lateral superiores derechos, en un paciente masculino de 16 años. [Rev. Cost. Cienc. Méd. 1985; 6(4):211-212].

INTRODUCCION:

Los antropólogos afirman que la cerebración del ser humano, constantemente en aumento, agranda su caja craneana a expensas de sus maxilares. La línea pre-hipofisiaria que se inclinaba hacia adelante de una frente hundida a una mandíbula prognática, en los seres primitivos, se ha vuelto casi vertical en el hombre moderno a medida que ha disminuido el número de dientes. Una dieta blanda y refinada requiere menos masticación y favorece esta tendencia, haciendo innecesario poseer un aparato masticatorio poderoso. Gran número de personas tiene dientes incluidos por ésta y muchas otras razones (4,5).

Se denominan dientes incluidos, retenidos o criptodónticos, aquellos que una vez llegada la época normal de erupción quedan encerrados dentro de los maxilares, manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico (4,5). La retención dentaria puede presentarse en dos formas: el diente está completamente rodeado por tejido óseo (retención intraósea) o el diente está cubierto por la mucosa gingival (retención subgingival) (4).

La secuencia de retención de piezas dentarias es la siguiente:

- 1- Terceras molares mandibulares.
- 2- Terceras molares maxilares.
- 3- Caninos maxilares.
- 4- Caninos mandibulares.
- 5- Biscúpides mandibulares.
- 6- Biscúpides maxilares.
- 7- Incisivos centrales superiores.
- 8- Incisivos laterales superiores (3,4,7).

El diagnóstico de un camino incluido en cuanto

a la posición, relación con sus vecinos y clasificación, se efectúa por medio de inspección, visualización, palpación y examen radiográfico,(6).

La retención del canino superior según localización se clasifica en labial, palatina e intermedia; bilateral y unilateral de acuerdo con el número de piezas dentarias y en maxilares dentados o desdentados, en relación con la existencia o no de otros dientes.

Los caninos retenidos pueden causar los siguientes problemas:

1. Dolor en una o todas las piezas dentarias.
2. Ruido en el oído.
3. Otitis.
4. Afecciones tales como visión nublada, ceguera, iritis y dolor semejante al del glaucoma.
5. Rizalasis, que es la reabsorción de las raíces dentarias, la que puede ser normal, como en el caso de los dientes temporales antes de ser exfoliados o patológica que también puede observarse en los dientes temporales, siendo sin embargo más frecuente en los permanentes. En estos casos se puede deber a la acción de un diente colocado en mala posición comprimiendo la raíz del vecino, a infección crónica y a la presión ejercida por quistes radiculares. El término rizalasis frecuentemente se confunde en la literatura odontológica con el de rizoclasia, el cual, según Avellanal, se usa para hablar de la reabsorción fisiológica de la raíz de los dientes caducos (1).
6. Quistes y tumores que, a su vez dan lugar a destrucciones óseas (2,4,6).

Si bien esta patología es ampliamente reportada a nivel internacional, en Costa Rica no se ha dado la divulgación pertinente, por lo que muchos pacientes han sufrido problemas de pérdida de piezas dentales permanentes aparentemente en buen estado, como por ejemplo el caso que se describe a continuación.

INFORME DE UN CASO:

El paciente masculino de 16 años, vecino de San Sebastián, San José, se presentó a la Clí-

* Sección de Diagnóstico, Facultad de Odontología.
Universidad de Costa Rica.



FIGURA 1

FIG. 1: Radiografía periapical que muestra canino superior derecho con rizalisis del central y lateral superiores derechos.




FIGURA 2

FIG. 2: Piezas dentales extraídas, en donde se observa el lateral y central superior derecho con su raíz totalmente reabsorbida, mientras que el canino sí mantuvo la integridad de su raíz.

nica de Diagnóstico y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, en mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, con dolor espontáneo y leve, en los incisivos central y lateral superiores derechos.

Al examen clínico se observó la ausencia del canino superior derecho y a la palpación se notó un abultamiento de la mucosa a nivel de los incisivos superiores derechos.

El examen radiográfico reveló la presencia de un canino incluído con rizalisis de los incisivos central y lateral superiores derechos.

El paciente fue referido a la Clínica de Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica. Se hizo la exodoncia del canino superior derecho, el cual se encontraba en posición intermedia. Debido a la pérdida de la raíz en los incisivos superiores derechos, se procedió a la extracción de estas dos piezas dentarias.

COMENTARIO:

El odontólogo está en la obligación de realizar minuciosos exámenes clínicos y radiográficos para detectar posibles patologías. Lo anterior es necesario para no llegar al extremo, como en este caso, en el cual, por falta de un diagnóstico precoz, fue necesario dos dientes anteriores permanentes.

Esta situación representó para el paciente una

gran pérdida desde el punto de vista funcional, estético, psicológico y económico, ya que fue necesario reemplazar los dientes extraídos por una prótesis fija.

ABSTRACT

A case of an impacted upper right canine producing rhizalysis in the corresponding central and lateral incisors in a sixteen years old male is reported.

BIBLIOGRAFIA

1. Avellanal, C. *Diccionario Odontológico*. Segunda Edición. Editorial Mundi, Buenos Aires, 1964; 652.
2. Costa, M.E. *Caninos Superiores Retenidos*. Monografía de grado. Universidad de Costa Rica. 1977; 2.
3. Coto S; Umaña G.A. *Caninos Superiores Incluidos*. Monografía de grado. Universidad de Costa Rica. 1978; 2.
4. Esquivel, J.L. *Dientes Retenidos*. Costa Rica, Publicaciones Universidad de Costa Rica, 1978; 3., 7, 8.
5. Kruger, G.O. *Tratado de Cirugía Bucal*. Cuarta Edición. Editorial Interamericana, México, 1978; 75-87.
6. Sesín, R. *Caninos Superiores Retenidos*. Monografía de grado. Universidad de Costa Rica. 1981; 22-23.
7. Shafer, W.G; Hine, M.K. Levy, B.M. *Tratado de Patología Bucal*. Tercera Edición. Editorial Interamericana. México, 1974; 64-66.