
Uso previo macrólidos o resistencia CLA>15%
NO
SI
Uso previo macrólidos Resistencia dual CLA/MTZ <15%
Alergia a Penicilina
Médico general
1ª línea
IBP /12h AMO 1 g /12h CLA 500mg /12h
IBP /12h AMO 1 g /12h DOX 100mg /12h
IBP /12h AMO 1g /12h CLA 500mg /12h MTZ 500mg/12h
IBP /12h MTZ 500mg /8h DOX 100mg /12h BIS 525mg / 12h
Prescripción Exclusiva medicos especialistas autorizados
2ª línea
IBP /12h MTZ 500mg /8h DOX 100mg /12h BIS 525mg / 12h
IBP /12h AMO 1g /12h LEV 500mg /24h BIS 525mg / 12h
IBP /12h LEV 500mg /24h CLA 500mg c/12h BIS 525mg c/12h
3ª línea
IBP /12h AMO 1g /8h DOX 100mg /12h BIS 525mg / 12h
IBP /12h DOX 100mg /12h RIF 300mg /12h BIS 525mg /12h
4ª línea
IBP /12h AMO 1g /12h RIF 300mg /12h BIS 525mg / 12h
Notas: 1. TODOS LOS TRATAMIENTOS SON POR 14 DÍAS
2. Abreviaturas: IBP (inhibidor bomba de protones)(Omeprazol 20 mg), AMO (amoxicilina), CLA (claritromicina), MTZ (metronidazol), DOX (doxiciclina)(tetraciclina disponible en CCSS), BIS (bismuto), LEV (levofloxacina), RIF (rifampicina)(rifamicina disponible en Costa Rica).