

Marina Méndez Campos


2013/01/14

De: WebMaster
Enviado el: jueves, 10 de enero de 2013 05:51 PM
Para: WebMaster
Asunto: AMTC-0082-01-13 Disponibilidad de miconazol 2%

9902



10 de enero del 2013
CIRCULAR AMTC-0082-01-13



PARA: DIRECTORES MÉDICOS, MÉDICOS PRESCRIPTORES, DIRECTORES DE SERVICIOS DE FARMACIA, FARMACÉUTICOS DE HOSPITALES NACIONALES, ESPECIALIZADOS, REGIONALES, PERIFÉRICOS Y ÁREAS DE SALUD.

ASUNTO: DISPONIBILIDAD DE MICONAZOL 2%


DE: ÁREA DE MEDICAMENTOS Y TERAPÉUTICA CLÍNICA

Handwritten signature and date 23/8/14

En la Lista Oficial de Medicamentos se incluye el código 1-10-46-2695, con la siguiente descripción: TIOCONAZOL 1% (10 mg/g) TUBO CON 30G Ó BIFONAZOL 1% (10 mg/g) TUBO CON 15G Ó MICONAZOL NITRATO 2% (20 mg/g) TUBO CON 30G. CREMA.

Recientemente se dio el ingreso al ALDI de la presentación farmacéutica miconazol nitrato 2%, bajo las mismas indicaciones y perfil de seguridad que el bifonazol, por lo que se hace un recordatorio de la dosis e indicaciones de este medicamento:

MICONAZOL NITRATO 2%



- ▶ Indicaciones: Tratamiento de candidiasis vulvovaginal; tinea pedis, corporis y cruris.
- ▶ No se debe utilizar en niños menores de dos años.
- ▶ Dosificación:
 - Tinea pedis y corporis: aplicar dos veces al día por cuatro semanas.
 - Tinea cruris: aplicar dos veces al día por dos semanas.
 - Candidiasis vulvovaginal: aplicar al acostarse por 7 días.
- ▶ Efectos secundarios: rash cutáneo, sensación de ardor, coloración rojiza.
- ▶ Contraindicaciones: hipersensibilidad a miconazol o algún componente de la formulación. Descontinuar en caso que aparezca irritación o sensibilidad.
- ▶ Recomendaciones para el paciente: lavarse las manos antes y después de aplicar el producto. Lavar y secar la zona afectada y aplicar una capa delgada de la crema sobre la misma.

Finalmente, no omito recordar la necesidad de cumplir a cabalidad con los lineamientos institucionales de uso de este medicamento.

Les saluda atentamente,