



07 de febrero de 2019

Sesión 2019-04  
CCF 0655-02-19

Doctores  
Jefes de Servicio de Gastroenterología  
Comités Locales de Farmacoterapia  
Jefaturas de Farmacia  
**Hospitales Nacionales y Regionales**

Estimados doctores:

**Asunto: Acuerdo Comité Central de Farmacoterapia**  
**Artículo 61 Asuntos varios 5: Situación del medicamento mesalazina supositorios en la CCSS**

Para lo procedente, la Secretaría Técnica le comunica lo siguiente:

El Comité Central de Farmacoterapia en la sesión 2019-04 celebrada el 30 de enero de 2019, considera pertinente que los casos tributarios a mesalazina supositorios pueden ser avalados desde los Comités Locales de Farmacoterapia según los lineamientos trabajados en conjunto con los gastroenterólogos, mientras se termina el Protocolo Institucional para el manejo de CUCI.

**Acuerdo:** El Comité Central de Farmacoterapia como Ente Asesor de la Gerencia Médica y la delegación que este le confiere, en referencia a la Situación del medicamento mesalazina supositorios en la CCSS, **acuerda** comunicar a los Jefes de Servicio de Gastroenterología, Comités Locales de Farmacoterapia y Jefaturas de Farmacia de los Hospitales Nacionales y Regionales con copia al Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica, lo siguiente: Se avala la autorización de los casos tributarios a mesalazina supositorios 1 gramo por los Comités Locales de Farmacoterapia según los siguientes lineamientos:

#### Tratamiento según la extensión de la enfermedad

##### **A.** Proctitis

###### **1. Enfermedad Leve (1° episodio o exacerbación):**

- Mesalazina supositorios 1 g /24 h vía rectal (VR). Si no hay respuesta, duplicar la dosis a 1 g c/12 h VR.

###### **2. Enfermedad Moderada (1° episodio o exacerbación):**

- Mesalazina supositorios 1 g/12 h VR.

##### **B.** Proctosigmoiditis

###### **1. Enfermedad Leve 1° episodio o exacerbación:**

- Mesalazina supositorios 1 g/24 h VR. Si no hay respuesta, duplicar la dosis a 1 g c/12 h VR.

###### **2. Enfermedad Moderada (1° episodio o exacerbación):**





- Mesalazina supositorios 1 g/12 h VR. Si no hay respuesta, duplicar la dosis a 1 g c/12 h VR.

Le saluda atentamente,

**COMITÉ CENTRAL DE FARMACOTERAPIA**

Dr. Ricardo Pérez Gómez  
**Secretario Técnico**

RPG/ymm

 Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica  
 Archivo