



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  
Dirección de Farmacoepidemiología  
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica  
Teléfono: 2539-0000 ext. 8601  
Correo electrónico: coinccss@ccss.sa.cr

**CIRCULAR**  
**DFE-AMTC-0751-2021**  
**09 de abril 2021**

**PARA:** Directores de Sede, Médicos Prescriptores, Jefaturas de Servicios de Farmacia y Enfermería  
Directores (as) de Gestión Regional y Red de Servicios de Salud  
Directores Médicos Hospitales Regionales  
Directores Médicos Hospitales Periféricos  
Directores Médicos Áreas de Salud y Clínicas  
Coordinación Nacional de Enfermería y Servicios de Farmacia  
Supervisores Regionales de Servicios de Farmacia y Enfermería  
Comités Locales de Vigilancia Epidemiológica  
Caja Costarricense de Seguro Social

**DE:** Doctora  
Paola Vásquez Barquero, Médico coordinador a.c.  
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica

**ASUNTO: CORRECCIÓN ESQUEMAS DE DOSIFICACIÓN CON LAS NUEVAS PRESENTACIONES DE MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOS DE DOSIS COMBINADAS**

Reciban un cordial saludo. Con respecto a las nuevas presentaciones de medicamentos combinados a dosis fijas para el tratamiento de tuberculosis, según lo comunicado mediante DFE-AMTC-2492-2020 del 18 de noviembre de 2020 se indicó que la fase de continuación debe administrarse en una sola toma diaria de lunes a sábado, siendo lo correcto **Lunes Miércoles y Viernes**, según la Normativa Vigente:

Fase de continuación de 4 meses de duración para adultos, adolescentes con peso $\geq 30$ kg	
Rifampicina 150 mg, Isoniazida 75 mg. Tableta recubierta.	
Rango de peso en kg	Número de tabletas en una sola toma diaria <u>lunes, miércoles y viernes</u> , en ayunas y al menos una hora antes de comer o dos horas después del desayuno



30 - 39	2
40 -54	3
55 - 70	4
≥70	5

Fase de continuación de 4 meses de duración tratamiento acortado en niños	
Rango de peso en kg	Número de tabletas en una sola toma diaria <u>lunes, miércoles y viernes</u> , en ayunas y al menos una hora antes de comer o dos horas después del desayuno
4 - 7	1
8 -11	2
12 - 15	3
16-24	4

A criterio del especialista, se modifica el esquema a tomar de tratamiento diario (incluido el domingo) y/o prolongar la fase de continuación por más de 4 meses en los siguientes casos:

- Coinfección TB/VIH-Sida, u otra comorbilidad
- Tratamiento inmunosupresor asociado
- Algunos tipos de TBE

Segura que la información les será de utilidad.