



**CIRCULAR**  
**DFE-AMTC-1755-2024 / DFE-AFEC-0950-2024**  
30 de setiembre del 2024

**Para:** Directores Médicos, Médicos Prescriptores, Jefaturas de Servicios de Farmacia, Comités Locales de Farmacoterapia de Hospitales Nacionales, Regionales, Periféricos, CAIS y Áreas de Salud

**Asunto:** Disponibilidad de Artemeter 20mg y lumefantrina 120mg, código 1-10-01-0195

Estimados señores.

Luego de saludarles, aprovechamos la presente para realizar un recordatorio sobre la disponibilidad del medicamento mencionado en el epígrafe, el cual se encuentra indicado en el tratamiento para adultos y niños en casos P. falciparum resistente a Cloroquina, según lo indicado en la Norma Nacional de Malaria y avalado por el Comité Central de Farmacoterapia, con los siguientes esquemas:

Para los pacientes sospechosos de Malaria y que sean procedentes de las siguientes zonas geográficas serán considerados resistentes a cloroquina: África subsahariana, Tailandia, región amazónica-Brasil, Colombia, Guyana, Ecuador, Venezuela, Escudo Guyánes, confirmados mediante laboratorio.

**Adultos mayores de 35kg:**

El tratamiento recomendado son 3 días y debe fraccionarse en 6 tomas con tabletas de Artemeter 20mg + Lumefantrina 120mg con base al siguiente esquema: 4 tabletas como dosis inicial, luego a las 8 horas nuevamente 4 tabletas y luego al día siguiente 4 tabletas dos veces al día (mañana y noche) por 2 días (para un total de 24 tabletas).

**Niños menores a 35kg:**

El tratamiento recomendado son 3 días y debe fraccionarse en 6 tomas con tabletas de artemeter 20mg + lumefantrine 120mg según el siguiente esquema:

<b>Peso</b>	<b>Día 1</b>	<b>Día 2</b>	<b>Día 3</b>
5 kg a menos de 15 kg (Total de tabletas-6)	Tomar 1 tableta como dosis inicial, luego a las 8 horas tomar nuevamente 1 tableta	Tomar 1 tableta en la mañana y 1 tableta en la noche	Tomar 1 tableta en la mañana y 1 tableta en la noche
15 kg a menos de 25 kg (Total de tabletas-12)	Tomar 2 tabletas como dosis inicial, luego a las 8 horas tomar nuevamente 2 tabletas	Tomar 2 tableta en la mañana y 2 tableta en la noche	Tomar 2 tableta en la mañana y 2 tableta en la noche
25 kg a menos de 35 kg (Total de tabletas-18)	Tomar 3 tableta como dosis inicial, luego a las 8 horas tomar nuevamente 3 tableta	Tomar 3 tableta en la mañana y 3 tableta en la noche	Tomar 3 tableta en la mañana y 3 tableta en la noche



Primaquina 15 mg tabletas: en el esquema de malaria resistente a Cloroquina y el uso concomitante de Artemeter + Lumefantrina, en niños y adultos es de una sola dosis de 0.75 mg/kg/día VO dosis única en el primer día (día 1).

**Mujeres embarazadas:**

Artemeter 20mg + Lumefantrina 120mg: No se encuentra recomendado para mujeres en el embarazo.

Adicionalmente, se recuerda que actualmente, se encuentran establecidos los siguientes sitios centinela:

1. Hospital San Juan de Dios
2. Hospital Enrique Baltodano Briceño
3. Hospital Ciudad Neily
4. Hospital Dr. Tony Facio
5. Hospital Monseñor Sanabria
6. Hospital San Carlos
7. CAIS Siquirres

El servicio de la farmacia, de acuerdo con la aparición de casos y confirmación de diagnóstico, debe solicitar el tratamiento requerido al centro más cercano considerando la zona geográfica y las vías de comunicación, aunque no sea el que le corresponde según la red de servicios oficial, mediante los procedimientos establecidos para el traslado de medicamentos.

Atentamente,

**ÁREA DE FARMACOECONOMÍA**

**ÁREA DE MEDICAMENTOS Y  
TERAPÉUTICA CLÍNICA**

Dr. Hugo Marí Piva  
**Jefe**

Dr. Carlos Icaza Gurdián  
**Jefe**

HMP/CIG/mjga

**Cc:**

-  Lic. Jorge Quirós Cedeño, jefe, Área de Gestión de Medicamentos
-  Dra. Xiomara Badilla, Sub-Área de Vigilancia Epidemiológica
-  Archivo